N°. 41.

Nouvelle methode d'amputer les membres que j'ai vu pratiquer aux hopitaux, de hasler, près de portsmouth, par mr Doods et yonge chirurgiens majors de cet hopital, à celui de St Barthelemi, à Londres, par m pott, aun grand nombre de sujets, avec le plus grand succès, cette methode m'a paru par un grand nombre des raisons meriter la préférence sur toutes les autres, et a pris naissance, sans Doutte dans le memoire de M. Louis. En angleterre, cette perfection est Donnée a mr. allanson chirurgien de Liverpool, mais je sais que M. allanson est une eleve de mr. poott, et mr pott m'a fait l'honneur de me Dire que c'etoit de lui qu'il tenoit cette perfection d'amputer les membres, ce qui me prouve que cette excellente methode est due au memoire de mr. Louis, et aux Recherches de mr. pott et que mr allanson n'a que la gloire de l'avoir bien saisie, et celle de l'avoir publiée en angleterre.

Manuel de l'operation

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Après avoir posé le tourniquet, au lieu Respectif du membre qu'on doit amputer, on coupe circulairement la peau, jusqu'aux muscles environ quatre pouces plus bas, plus ou moins suivant la grosseur du membre du lieu, où l'on Doit couper entierement le membre, cella fait on Disseque avec toute la Dexterité possible, la peau, en lui conservant tout son tissu cellulaire, de bas en haut circulairement, jusqu'environ quelques lignes au dessus du lieu, où l'on doit couper les muscles &c.a la peau ainsi Dissequée ou Detachée des muscles, on l'a renverse par en haut, comme on renverse un Bas, ce qui

ARC 58 n°41

est très facile de faire par raport a son elasticité, on fait tenir
ce renversé par un aide, alors on coupe les muscles un peu
de bas en haut de maniere que la section des muscles
forme une cône, on passe comme dans les autres
methodes des compresses fendues pour retirer les muscles
en haut, on coupe circulairement le perioste quon ratisse
par en bas, on scie les os de la maniere la plus methodique
on coupe les asperités des bords des os, on essuie la
plaie avec une Eponge, on lache auparavant le tourniquet
pour Decouvrir les ~~tourniquet~~ extremités des vaisseaux,
on les saisit de part en part, avec un tenaculum
alors un aide passe entre la convexité du tenaculum
et la surface du moignon, un fil en double, lié;
L'operateur fait tenir le manche du tenaculum, et serre
lui meme le nœu autant qu'il est necessaire pour
quil ne glisse point ce premier nœu arreté par un second,
il coupe avec des cizeaux les fils très près du nœu, il en
fait de meme de tous les autres vaisseaux, les ligatures
faites, on lache le tourniquet pour voir si l'impulsion
arterielle ne chasse point quelqu'unes des ligatures, ce quon
doit prevenir en serrant un peu plus que dans les autres
methodes; lorsque le sang des gros vaisseaux ne
donne plus, on lave la surface du moignon avec de l'eau
un peu tiede par le moyen d'une Eponge, cella fait
on essuye et on dessèche la plaie autant quil est
possible avec des Eponges bien Exprimées, tout cella

fait ainsi, on descend les tegumens, on les ramene sur la surface du moignon, on abouche bien intimement les bords des tegumens, et pour que cette union soit sans ride et bien exacte, il faut necessairement qu'elle forme une ligne droite; pour contenir cette union bien intimement on a des bandelettes agglutinatives, d'un pied et demi de longueur sur deux pouces de largeur, plus ou moins suivant la grosseur du membre, qu'on ramollit sur le fait qu'on les applique, en les presentant devant un rechaud, pour les appliquer on pose la premiere au milieu les bouts se collant le long du membre de chaque côté par cette longueur, on voit que la piece de cette bandelette vient de loin, on place des autres successivement de chaque côté, et on applique par dessus, cette rangée de bandelettes qui doit couvrir tout le moignon, une emplatre de savon, tel qu'il se trouve dans la pharmacopée de Londres, des compresses et une bande a l'ordinaire terminent le bandage.

on ne leve cet appareil que six ou sept jours après l'operation, ce qui demande, les memes precautions en le levant que la reunion d'une simple plaie parceque si on tiroit ces bandelettes a contre sens on pourroit decoller la reunion.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ayant été pris le 12 avril sur le vaisseau le Pegaze et ayant été chargé d'un officier de distinction a qui j'avois amputé une jambe pendant le combat qu'
a soutenu contre les anglois, j'ai eu ocasion de faire

L'hopital de Gasley pendant trois mois, et un mois celui de St Barthelemi à londres, dans lequels hopiteaux principalement a celui de Gasley j'ai vu un grand nombre de sujet Operés par cette methode, et gueris les uns dans trois semaines les autres dans un mois, et le plus tard dans cinq ou six semaines, cette Réunion suppure très peu, et la plus part ne font qu'exsuder pendant quelque tems,

entre autres grands avantages qu'on retire de cette methode sur les autres, est celui de conserver une peau naturelle a la surface du moignon, qui n'est pas susceptible de se Dechirer, ni de s'excorier, comm'est une surface d'une cicatrice qui a un corps innorganisé, tous ces avantages observés par mes yeux, m'oblige à avoir l'honneur D'en rendre compte, et par la payer ce que je Dois, à ma nation, n'étant pas fait pour ecrire j'espere que la verité que contient mon memoire me procurera De l'indulgence pour mon Defaut d'eloquence.

Langlade chirurgien-major du pegaze.